

513

1920: 385

SILKEBORG BAD

418 Lb. Nr. 437
1768

Bolig: Silkeborg

Navn: Knud Jensen

Alder og Stilling: 17aar, Søn af Rasker

Bopæl: Silkeborg

Indl.: 12 - 8 - 19 19.

Udskr.: 23 - 8 19 19

Ialt Dage

12
alt 5-8-20
20-8-20
16 Dage

Journal optaget af

Indl. for

Axel Hansen

af

Silkeborg

dyspepsia nervosa

(ulcus ?)

1920

vagotonia

ulcus duodeni

Düngelet til vænn; sløj; træt, isidder om sit
Løgn uendelig kunnst for en Mandelidder, der
sykter sig ved Indtølmene for endelidder
Side, hvilket den uend til Stede i endelidder
at Side kunnst om Tind.

Han tæller ikke nogen Røtter, Karl. Røtter, der
Jede Vane, g. Løgn mindre Tind; - som Tind
Aff. den kunnst uend i Viden 1-2 Løgn g. Løgn
Løgn uend uend; men siden i Tind
(uend Stetelidder!). Han den uend i uend
Røtter af Stetelidder; indtil den Tind, som
den kunnst uend stegner om Tind uend apial.
Han uend at den uend af Høstgør, Tind.
g. Høstgør til uend. Som g. Løgn.
Angør at den uend i det den som Røgn.

Sten uend

Løgn uend, spunkel Løgn.

Løgn uend: uend. som Løgn uend Tind.

Høstgør g. Løgn Tind uend. Tind 54 uend
Høstgør uend. g. Løgn. Tind den uend g. Løgn.

Stetelidder. Tind. g.

Stetelidder. Tind. uend. Tind.

Løgn uend uend.

Stetelidder uend Populidder uend.

Tind stede kunnst, uend Stetelidder.

Tind kunnst. Løgn. men uend.

uend uend uend, i den uend Stetelidder.

Stetelidder 54.

Accumulation af R. g. ieteris

Stetelidder. Løgn g. uend. g. Løgn. In uend at uend
uend Løgn uend (uend Røgn uend).

Stetelidder uend.

Stetelidder uend til Stetelidder

Løgn uend uend Tind

Stetelidder (R. Røgn). 100.

Stetelidder (L. R) 85

Stetelidder 184

Stetelidder 122

Stetelidder: g. a g. S.

Løgn uend

Stetelidder

Stetelidder II

Stetelidder 37-38

10-X 6

Stetelidder 36-25-X 6

Stetelidder 1X 2

13/8 Fastende Ventrikul : 15 cm slæmst væske

Kong 25² Mucopolysaccharid 45

14/8 Smæld 1/2 T : 90 cm + meget slim i faldet

Kong 27 Mucopolysaccharid 47

Skyllevand 170 cm : 10 Mucopolysaccharid Totalacid 70

15/8 Bouget 6 T : en del vedskæres
i ringt klist skyllevand

Milt-amar-alkalisk

Kong-alkalisk

brunte nativt 300

brun. — 20

— 7.5

10/8 x 3

22/8

cont

Diet II

2 cm

saltvand væske

2 ppgl. fløde

Atter indl. 5/8 1920

Her stadig holdt Diet 2: ÷ Røgbrød, alle
grove og fede Spiser, Krydderier og stegt Kød
Især Mælk.

Appetit uoplyst

Afføring træg, af 3 til Diarrhoe

Bolig: N.H. 5

Navn: Runt Spreng

Cont: 1

÷ Sælsmerter.

Når Diäten overskrides kommer der Hovedpine,
Svimmelhed, Opkastninger, ÷ Brudekø og
Svien ÷ Lige Opstod

Kundtiden ret høj feber under Anf. (39.8°)

Adnig gult under Anf.

Afføringen ofte sort

Næst udtørst.

Før let Hjertebanker

Meget høj og magt. Let gullig Ansigtspore

Steth. pæler ÷

Steth. cordis Grænsen: midten af Sternum,

c₃, ictus og c₆ i Papillorubinen.

Aktionen ret uregelm. høje resp. og
sforstolte Arthemi. Tonerne nem

stærk Accent. af P_{II}. Puls 48.

÷ Penket i Epigastriet

+ — langs Colon Transversum

Embel Aem p^o Truncis

Extr. nat. Reflekser til Steth.

Rp. Diet II : Rr : Fish
 435 36-39 10 min. 6
 61 * 6

Blutdruck 140 (S. 141)

Harnstoff 70 (L. P.)

Lein : A : 5

Stoffe 188

Nozt 129

4/8 P. 60 regulierung

7/8 Faser : Rr : Rr + Lier Skinn.

18/8 — : Rr : Rr.

12/8 — : — : — v. 129

Stillingia cordis : systolische Entziehung

— nach Blasen ; p. 11 let.

acuturset

P. 54. Faser i' cardia, 6. 27

typhus of Meade

Mixt. amara - 300

branta m. 15

breast. m. 75

P. 1 - 1. 27 8 5

12/8 faser : Rr : Rr. 17/8 Kib ; aff.

Stellig ; appetit gut
P. 5-8

20/8 in gen anfall larnede

let Decet

mixt. p. 2