S. B

SILKEBORG BAD 79 Lb.-Nr. 117

Bolig: Skovville 6

Navn: Gunnar Faber

Alder og Stilling: 51 År g. Murermester

Bopæl: Kongensvej 18

Indl.: 10 — 6 — 1922

Udskr.: 24 — 7 1922

Ialt 44 Dage

Journal optaget af Curt Schultzer

Indl. for

af

ulcus duodeni
gastro-enterostomia sequel

Pt. har været rask før (Pleuritis for 18-20 År siden)

For 6-7 År siden begyndte Pt. at lide af „Mavesår". Der var Sm. og Tyngde i Cardia efter Måltiderne. ~~Ingen~~ Tegn på Blødning, hverken Hæmatemese ell. Melæna.

På Gr. af Generne lod Pt. sig operere på Diakonissestiftelsen. Der blev i Jan. 1921 gjort Gastro-entero-anastomose, der dog ikke gav Tarmpassage, således at der måtte en ny Operation til (en Entero-entero-anastomose) for at sikre Passagen &

Pt. har i de sidste Par År lidt noget af Kraftesløshed og Koldhedsfølelse i v. Crus, hvad han selv tilskriver Flebektasier. Han bruger Flonelsbind.

Pt. er af nat. Udseende, svarende til Alderen. Er ikke anæmisk eller mager.

Pupillerne er ens, reagerer.

Steth. cordis Tonerne meget fjerne, men skarpe og rene.

Steth. pulm. ÷ Dæmpning. ÷ Rh.; h. Infrascapularis høres svækket Respira-

Efter ca 1 Års relativt Velbef. følte Pt. sig dårlig og sløj i Jan. 1922, og lod sig undersøge af Dr. Thaysen, der fandt Blod i Faeces. Pt. lå i 6 Uger og blev beh. m. meget streng Diæt, hvorefter Blødningen standsede. Afføringen er siden da blevet regelm. undersøgt for Blod, og nu for ganske kort Tid siden var der igen Blod i Aff., hvad Pt. tilskriver noget usvante Anstrengelser ved Rejseforberedelserne.

tion.

Abdomen: I Midtlinien, mellem proc. ensiform. og Umbilicus, en Cicatrice efter Operationerne. Cicatricen er lineær og fast. Der er nogen Ømhed svarende til Cicatricen. ÷ Udfyldninger.

Extrem: Der ses på begge Crura, særlig det venstre, Flebektasier af diffus Karakter. ÷ Oedemer. Refleserne til Stede. Ingen grovere Sensibilitetsforstyrrelser.

Blodtryk 120 mm (Riva-Rocci) 130 (Sahli)
Hæmoglobin 80 % (Tallqvist).
Faeces ÷ sanguis (benzidin)
Urin sur ÷ a ÷ S ÷ P ÷ Bl
Højd 174
Vægt. 129

Rp. Saltbad 35-36 10 m × 6
Rd 36. 25 × 6
I Badet ikke Gnidning på Krop, men kun på Arme og Ben

Massage e. Aftale

Om Morgenen Olivenolie 1 Sp + Subsal. bismuth. 5 gr
do midt på Dagen.

Frokost The, 2 Tvebakker, 2 Stk Grahamsbrød, 1 Æg.
Middag Maizenagrød m. Mælk
Kogt Fisk + Gemyse
Aften = Frokost
Extra The om Eftermiddagen. 1 l Mælk i Løbet af Dagen.

Bolig: 54. 6
Navn: Gunnar Faber Cont: I

16/6 Faeces ÷ Blod (svag benzidin)

17/6 Faeces ++ Benzidin

18/6 100 gr caramel

V. 129

Hver eftermiddag lidt mavesmerter — 3-4 timer efter maaltidet varende 1½ time, siddende under og lidt til højre for umbilicus; ubetydelig opstød; ro om natten afføring (efter olivenolie) om formiddagen; afføringen sort (af bismuth) tager 5 gram bismuth hver morgen.

Taaler massagen, taaler salt-badene; hæmorrhoiderne blødes ikke for tiden

Rp saltbad × 3
vaad pakn 1/2 7 × 3
varmt [illegible]
(varm [illegible])

20/6 V. ben fryser om natten
Søvn 5–6 timer daglig
aff. i orden. smerterne kommer
om eftermiddagen kl 4 (middag
kl 1) og kl 9 (aften kl 6½)
– ikke stærke; ÷ kvalme
÷ hovedpine ÷ svimmelhed

Skotsk Douche
2 ~~[illegible]~~ × 6
v. ben

bismuth subgall
10
— sub salicylat
40
25 % magnesia [illegible]
50
m. f. s.
1 teskef. × 3

Faeces ÷ Benzidin

21/6 Faeces: ÷ Benzidin.
22/6
23/6 Faeces: ÷ Benzidin

24/6 Benene kan nu blive varme
Har næsten diarrhoea aff.

pulveret
cent ½ dosis

Smerterne i abdomen er
ikke som de gamle ulcus-
smerter ~~[illegible]~~ han føler
at maden løber gennem
de forskellige bugter tarme og
afbøjninger
Føler sig væsentlig normal

kl 4 ½ ggl fløde
2 stk franskbrød
+ Te

og og til desserter
eller andet sødt. —
(i purée)

26/6 Faeces: ÷ Benzidin
27/6 Faeces ÷ Benzidin
28/6 V. 130 ℔; bliver ikke helt varm
i de vaade pakninger.
½ b × 3
istedet for Rd

Faeces: ÷ Benzidin.

1/7 V. 132 ℔ De sidste 2 dage
lidt smerter og ubetydelig
kvalme; dagl. afføring
[illegible]
Hønsekød

Tg. nu
Tp. normal

3/7 Faeces ÷ bl (2 undersøgelser)

4/7 Har i nat haft 9 timers smerter
samt kvalme (meget pigtigt og
kildigt vejr); har igaar spist fisk
og frugt (stikkelsbærgrød) samt fløde
Tp 36.9; abdomen blødt
nogen ømhed til ~~[illegible]~~ for cicatricen
har skrevet testamente

Mixt. nervina

Bolig: Sh 6.
1922
Navn: Gunnar Faber
Cont: II

partiner efter lidt smerter
8/7 Faeces: + Slim ÷ Benzidin

11/7 Smerter 2–3 gange om natten
og om ~~dagen~~ varende
c. ½ time

[illegible] + vat
vesperl

Kp Fyr 37–39 10 × 6
½ b × 3
Skotsk Douche 2 ~ × 6
v. ben
½ b × 3
Rd 36–25 × 3

cap × 3 (!!

om aftenen vel; kan spise
regelmæssig i Dag

5/7 Faeces: ÷ Bl. (3 prøver)
6/7 Faeces: ÷ Benzidin (3 prøver)

8/7 V. 131 Spiser nu væsentligt
diæt II, men har Dag et

12/7 god virkning af cingulum
13/7 Befindende rask. Søvn god; stadigt lidt
kolik om natten V. 133 ℔
Tg. lidt belagt; ÷ kvalme
~~Fo~~
16/7 Faeces: ÷ Slim 18/7 Vel; mindre
smerter end tidl. — kan

---

nu masser det vel
om natten.

22/7 Inat en omgang" med
smerter — kolik'er — varende
et par timer.
V. 132 ℔

24/7 Vel + 3 ℔, vægtforøgelse
som helhed set vel; mavesmerter
lidt hver Dag — værst efter
aftensmaaltidet — om aftenen
i sengen kl 11–12

Forsøgsvis
atropinpiller
p.m.
cum Mixt. nervini
1–2 sp. vesperi

pulv. subnitr. bismuth
c. magnesia
[illegible] p.r.
cingulum

31/1 1923

Efteraaret 1922 jævnt godt; aldrig myndig=
gende; ofte natlige smerter. aldrig febril, al 2
Dag gentlige opkastninger; abdomen blødt
under anfaldene. Diæt holdes, men patienten
taaler egentlig al mad, naar den er
fint fordelt; aldrig tegn paa blødning.
Humøret godt om Dagen; pt. er virksom
og altid i aktivitet, altid interesseret, altid
parat til at hjælpe andre, altid oplagt.
Pt. har ingen trang til narcotica; han synes
snarere narcotica forværrer. Forsøg med

tinct. thebaic
aeth. sp. camph.
extr. fl. rh. pirlo āā
20 Draaber × 3 } i en særlig slem periode

forbedrede ikke tilstanden; andre antispastiske
midler (atropin f.ex, spasmalgin o.s.v)
har kun ringe virkning — ligesom Mixt.
nervina. Bedst hjælper store doser Bismuth
og affførings midler, især clysmata

Pt. har selv indtryk af at naar det be=
gynder at rumle i tarmen" saa lettes
det paa hele tilstanden.

H. J. Panner,
Chef for Rigshospitalets Røntgenklinik. H. C. Ørstedsvej 70, d. 16/1 1923

Morfin har han saa godt som aldrig faaet, en sjælden gang gtt. rosæ. Han er selv ikke ivrig og har kun ønsket det under de værste anfald.

Den sidste Maaned har han haft anfald hver nat. Til morgen overværede hans læge (Arne Faber) et saadant anfald (Han ligger for sig og fandtes af familien i morges liggende paa gulvet, hvor han laa stadigt klagende):

Tp normal, puls normal. Ansigtsfarven lidt bleg. Tungen normal; ÷ hikke; blødt abdomen; colon descendens (S. Romanum), over hvilken smerterne sidder, synes fast og tyngd at føle paa; intet sted ud spilede tarme. Under mit ophold (c 1 time) stadige klager og motorisk uro; berøring af abdomen fremkaldte nyt heftigt anfald inj. i ampl. gav ro

Til indlæggelse Diakonissestiftelsen

Ved Röntgenundersögelsen af Murmester Gunnar Fabers Ventrikel findes Gastroenterostomien at fungere godt, idet Barytgröden meget hurtigt, allerede ved förste Mundfuld, begynder at tömme sig gennem den kunstige Aabning. Det strömmer saa hurtigt ud gennem denne, at Jejunum undertiden ses meget stærkt fyldt lige ved Ventriklen, saa at det er vanskeligt at tyde Forholdene nöjagtigt, ~~men~~ idet der dannes en meget kompakt Skygge omkring Gastroenterostomistedet. Paa den anden Side er der næppe Tale om nogen Passagehindring her, idet der ikke er nogen konstant Ophobning nogetsteds, og paa visse Billeder synes det, som om man kan se baade Gastroenterostomislyngen og Enteroenterostomislyngen. Nogen Passage finder ogsaa Sted gennem Pylorus.

Der er ingen Ømhed og ingen paaviselige Tegn til Ulcus.

Efter 4 Timers Forløb indeholder Ventriklen endnu lidt af Barytgröden, men kun en ringe Rest.

24 Timer efter er hele Colon fyldt, og Appendix ses som en tydelig Skygge, men der er ingen Ømhed paa dette Sted.

3 x 24 Timer efter Barytmaaltidet findes endnu lidt spredte Rester i Colon, og man ser ogsaa lidt Rester i Appendix, men der er stadig ingen Ømhed, og Appendix er forskydelig. 5 x 24 Timer efter Baryt m. er Appendix tom, der er derfor næppe noget abnormt ved denne, og i det hele er Undersøgelsen saa temmelig negativ.

H. J. Panner